



## 伏 令 夏 橙

**别名：**佛灵夏橙、晚生橙、华兰西晚橙。

**产地：**主产美国、澳大利亚、西班牙等国，为世界柑桔栽培面积最大的品种，目前我国四川栽培较多，广东、广西、福建、云南等省已相继引种。是当前发展最快的柑桔品种之一。

**性状：**树冠高大，圆头形，树势强健，枝梢壮实，稍直立，叶片长卵圆形。果实圆球形或长圆球形，中等大，平均果重136-171克；果皮橙黄色或橙红色，表面稍粗糙；油胞大，突出；中心柱较大，充实；汁胞柔嫩多汁，风味酸甜适口，可溶性固形物11—14%；品质中上。种子6—7粒。成熟期一般为次年4月下旬—5月中旬。

由于果实留树越冬，在冬季气温较低（一月份均温低于10℃）或有霜冻地区，易大量脱落，若冬前喷布植物生长素2,4-D可大大减少落果。

本品种产量高，品质较好，特别是成熟期特殊，对调节市场供应、对外贸易有重要价值。目前除四川发展较多外，广西、广东许多地方已试种成功，获得广泛好评，开始大量发展。我国柑桔产区，凡冬季气温较高，无明显冻害的地区均可大量发展。

## 五 月 红 甜 橙

**产地：**四川省农业科学院园艺试验站于1951年在江津永丰乡实生甜橙树中选出。目前四川江津、重庆、川东南地区有少量栽培，广东、广西、湖南、湖北等省亦有引种。

**性状：**树冠圆头形，较开张，树势旺，叶长卵圆形。果实圆球形，中等大，单果重120克左右；果面光滑，油胞小而密，果皮橙红色，较薄；果肉细嫩，汁多，甜酸适度。有香味。成熟期为次年4—5月。比伏令夏橙稍早。

本品种对环境条件的要求以及栽培上存在的问题与伏令夏橙基本相同，凡能栽培伏令夏橙的地区都可栽培五月红甜橙。

晚熟甜橙中还有广西桂林的桂夏橙及刘金光夏橙，均有栽培价值。

(本所柑桔良种选育小组)